(uputstvo)

Ivančić gel za rane i opekotine

Hidrokoloidni gel za rane
Bez parabena

Indikacije

Ivančić gel za rane i opekotine je hidrokoloidni gel koji ne sadrži parabene. Indikovan je za negu površinskih suvih ili vlažnih rana. Ivančić gel za rane i opekotine je medicinsko sredstvo koje indirektno potpomaže zarastanje rana tako što reguliše mikrosredinu rane. Primenjuje se kod akutnih i hroničnih rana kao što su:

- Površinske opekotine
- Oderotine
- Hirurške rane
- Dekubitus
- Otvorene rane na nogama (ulcus cruris)

Osobine i sastav

Ivančić gel za rane i opekotine je izrađen od kiselog karbomera stabilizovanog karnozinom, baznim peptidom koji se prirodno nalazi u koži. Prekrivajnjem suvih rana kao što su oderotine i hirurške rane ovim karbomerom, postiže se okluzivni efekat: zaustavlja se isparavanje i time smanjuje gubitak tečnosti kroz epidermis.
Karnozin štiti kisele polimere i istovremeno deluje kao antioksidans.
Iz vlažnih, eksudativnih rana, karbomer apsorbuje višak tečnosti.

Ivančić gel za rane i opekotine deluje umirujuće, olakšava primenu flastera i/ili zavoja i nije lepljiv.
Umesto parabenima koji deluju iritirajuće, Ivančić gel za rane i opekotine konzervisan je srebro-citratom.

Sastav: kiseli koloidni karbomer, karnozin, voda, konzervans: srebro-citrat

Uputstvo za upotrebu

Zatvorene rane:

- Očistiti i dezinfikovati površinu koja će se tretirati
- Aplikovati Ivančić gel za rane i opekotine bez dodirivanja rane sprej bocom
- Ukoliko je potrebno, prekriti zavojem ili flasterom

Otvorene rane:

- Očistiti i dezinfikovati ranu

- Pažljivo tapkanjem upiti tečnost
- Aplikovati preparat u debljem sloju (0,5 – 0,75 cm)
- Prekriti zavojem ili flasterom
- Ne menjati zavoj jedan do tri dana, sve dok se gel ne rastvori
- Smanjiti primenu preparata kada se na rani formira krasta

Obratiti pažnju – *opekotine*: najpre ohladiti vodom, zatim primeniti opisani postupak

Kod opekotina, Ivančić gel za rane i opekotine se ne primenjuje kao prva mera!
Opekotinu treba odmah hladiti pod mlazom blago smlačene tekuće vode oko 20 minuta.
Ovaj postupak treba primeniti što je pre moguće, jer pozitivan efekat slabi sa vremenom i sasvim se gubi posle 30 minuta. Da bi se izbegao rizik od hipotermije ne preporučuje se upotreba potpuno hladne vode, posebno kada opekotina zahvata veliku površinu.
Ivančić gel za rane i opekotine primeniti tek pošto se prethodno izvrši procena težine opekotine.


Posebna upozorenja

Nisu zapažena neželjena dejstva kao što su iritacija ili preosetljivost. Ivančić gel za rane i opekotine nije podesan za primenu u oči, na očne kapke i sluznicu.

Uvek treba potražiti savet lekara
- Kod rana koje zahvataju veće površine ili kod vrlo dubokih rana
- Kod malih, inficiranih rana
- U slučaju sporog zarastanja rana ili postojećeg rizika od komplikacija

U takvim slučajevima, Ivančić gel za rane i opekotine može biti od koristi, ali nikako nije dovoljan za sprovođenje tretmana.

Ne koristiti preparat po isteku označenog roka upotrebe (videti pakovanje).
Samo za spoljnu upotrebu.



Pri prvoj upotrebi spreja se može desiti da je potisak spreja prejak.
Najpre isprobajte sprej (npr. u poluotvoreni dlan) pre nego što ga usmerite na ranu.

Datum poslednje revizije ovog uputstva: maj 2009.

℮ 75 ml

CE 1639

Proizvođač:



Booiebos 24
9031 Drongen
BELGIUM

IVANČIĆ I SINOVI

Uvoznik i distributer:

IVANČIĆ I SINOVI d.o.o.
Palmotićeva 13
Beograd
Srbija