MAKROGOLAXAN®

Prašak za oralnu primenu u terapiji opstipacije

SASTAV
Jedna kesica sadrži:
makrogola 13,125 g
natrijum-hlorida 0,351 g
natrijum-bikarbonata 0,179 g
kalijum-hlorida 0,046 g

Polovina kesice sadrži:
makrogola 6,563 g
natrijum-hlorida 0,176 g
natrijum-bikarbonata 0,089 g
kalijum-hlorida 0,023 g

Ekscipijensi:
silicijum-dioksid, aroma, saharin-natrijum

PAKOVANJE
20 deljivih kesica sa po 13,88 g praška za oralnu primenu

MEHANIZAM DEJSTVA
Aktivne komponente medicinskog sredstva Makrogolaxan su makrogol 3350 i elektroliti. Makrogolaxan u lumenu creva vezuje veliku količinu vode što rezultira razmekšavanjem fekalne mase i stimulisanjem prirodne peristaltike. Makrogolaxan se ne resorbuje iz creva i biva izbačen iz digestivnog trakta u nepromenjenom obliku. Zahvaljujući prisustvu soli natrijuma i kalijuma u preparatu, u crevima ne dolazi do narušavanja ravnoteže elektrolita.

INDIKACIJE
Hronična opstipacija.

KONTRAINDIKACIJE
Makrogolaxan se ne primenjuje kod postojanja:
- intestinalne stenoze (začepljenje creva)
- perforacije creva
- zapaljenjskih bolesti creva kao što su ulcerozni kolitis i Crohn-ova bolest.

TRUDNOĆA I DOJENJE
Nema iskustava sa primenom medicinskog sredstva Makrogolaxan u periodu trudnoće i dojenja. Stoga se primena preporučuje samo ukoliko to lekar preporuči.

INTERAKCIJE
Nema poznatih interakcija.

DOZIRANJE I NAČIN UPOTREBE
Preporučeno doziranje, osim kada lekar propiše drugačije, je:

Odrasli, starije osobe i deca preko 12 godina
Jedna cela kesica 1–3 puta na dan. U slučaju dugotrajne primene, doza se može smanjiti na 1–2 kesice na dan. Otvoriti kesicu duž linije koja označava celu dozu i sadržaj razmutiti u 125 ml (1 čaša) obične vode.

Deca od 7 do 11 godina
Polovina kesice 2 puta na dan.

Deca od 3 do 6 godina
Polovina kesice jednom na dan.
Otvoriti kesicu duž linije koja označava polovinu doze i sadržaj razmutiti u 62,5 ml (1/2 čaše) obične vode.

Pacijenti sa oštećenjem bubrega
Prilagođavanje doze nije potrebno.



Front

CE 0426

TRAJANJE TERAPIJE
Makrogolaxan ne treba koristiti duže od 2 nedelje u kontinuitetu. Produžena primena može biti neophodna u slučaju uporne ili hronične opstipacije, koja može biti povezana sa primenom nekih lekova, opioidnih analgetika i antiparkinsonika (antiholinergici) ili bolestima kao što su multipla skleroza ili parkinsonizam.

UPOZORENJA
Oralna suspenzija mora biti pripremljena neposredno pre primene.
Oralnu suspenziju ne treba mešati sa drugim rastvorima ili napicima kako ne bi došlo do promene koncentracije elektrolita.
Proizvod treba čuvati van domašaja dece. U slučaju pedijatrijske primene, preparat treba da administrira odrasla ili kvalifikovana osoba.

PREDOZIRANJE
U slučaju predoziranja, mogu da se jave intenzivan bol ili stomačna distenzija. Gubitak tečnosti izazvan dijarejom i povraćanjem može zahtevati korekciju disbalansa elektrolita.
Treba se odmah obratiti lekaru.

AKO SE PROPUSTI UZIMANJE DOZE
Nemojte uzimati dvostruku dozu, nego sačekajte vreme za sledeću dozu.

NEŽELJENA DEJSTVA
Mogu da se jave želudačne i crevne tegobe, bučna creva, bol u stomaku, mučnina i blaga dijareja, posebno u početku tretmana.
Retko mogu da se jave reakcije preosetljivosti.
U slučaju da zapazite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite svog lekara ili farmaceuta.

ČUVANJE
Čuvati van vidokruga i domašaja dece.
Ne koristiti proizvod po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe je odštampan na kesici i na kutiji.
Ne koristiti proizvod ukoliko je kesica otvorena ili oštećena.
Čuvati na temperaturi koja ne prelazi 25°C.

Čuvati na temperaturi koja ne prelazi 25°C.

Medicinsko sredstvo za jednokratnu upotrebu.

Revizija: oktobar 2011.

Proizvođač:
S.I.I.T. S.r.l. Via Ariosto 50/60 - IT 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Milano, Italija

Nosilac upisa, uvoznik i distributer: IVANČIĆ I SINOVI d.o.o., Palmotićeva 13, Beograd, Srbija

Back