Panaterm®, 120 mg/5 ml
Sirup, 125 ml, paracetamol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim neophodno je da pažljivo koristite lek Panaterm, da bi ste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputsvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek Panaterm i čemu je namenjen.
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panaterm.
3. Kako se upotrebljava lek Panaterm.
4. Moguća neželjena dejstva.
5. Kako čuvati lek Panaterm.
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LEK PANATERM I ČEMU JE NAMENJEN
Panaterm sirup sadrži aktivnu supstancu paracetamol koja ima analgetičko i antipiretičko delovanje.
Panaterm sirup je namenjen ublažavanju bolova pri izbijanju zuba, zubobolje, zapaljenja grla kao i snižavanju visoke temperature u slučajevima inflamatornih procesa, gripa, infektivnih oboljenja kao što su: ovčije boginje, veliki kašalj, male boginje i zauške. Takođe se preporučuje za sniženje temperature, koja se javlja nakon imunizacije kod dece mlađe od 2 meseca.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Panaterm
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Panaterm ne smete koristiti
- ako ste preosetljivi (alergični) na paracetamol ili na bilo koji sastojak leka Panaterm.
- ako imate ozbiljno oboljenje jetre.

Kada uzimate lek Panaterm posebno vodite računa:
- Ukoliko dete uzima i neke druge lekove, obavezno proverite da li sadrže paracetamol. Obavezno se posavetovati sa lekarom kako se ne bi premašila maksimalna preporučena doza.
- Upotreba leka dovodi do brzog snižavanja povišene temperature. Obavezno se obratite lekaru ukoliko se povišena temperatura ne snizi ili potraje, ukoliko se stanje pogorša ili primetite znake novog oboljenja.
- U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.
- U slučaju predoziranja odmah se obratite lekaru, čak i ako se dobro osećate, zbog toga što postoji rizik od oštećenja jetre.

Primena drugih lekova

- Istovremena upotreba Panaterm sirupa sa preparatima koji sadrže paracetamol povećava mogućnost oštećenja jetre. Paracetamol i u malim dozama može potencirati dejstvo lekova protiv zgrušavanja krvi.
- Lekovi koji se koriste za lečenje padavice mogu pri istovremenoj upotrebi sa paracetamolom povećati rizik od oštećenja jetre. Treba ograničiti upotrebu paracetamola u samolečenju kod osoba koje redovno uzimaju lekove u terapiji padavice-epilepsije. Paracetamol dat bolesnicima koji se redovno leče fenotiazinima (lekovi za lečenje psihijatrijskih oboljenja) može izazvati izraženo sniženje telesne temperature.

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Panaterm sa hranom ili pićima

Panaterm je namenjen deci. Tokom terapije paracetamolom, upotreba alkohola ili lekova koji sadrže alkohol nije preporučena usled povećanog rizika od oštećenja jetre.

Primena leka Panaterm u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni, obratite se Vašem lekaru.

Ovaj lek ne treba primenjivati ako ste trudni ili dojite.

Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.

Uticaj leka Panaterm na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nema podataka da paracetamol utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Panaterm

- Ovaj medicinski proizvod sadrži sorbitol. Ukoliko Vam je rečeno od strane Vašeg lekara da je kod Vašeg deteta prisutna netolerancija na neke šećere, kontaktirajte lekara pre davanja ovog leka detetu.
- Lek sadrži metil- i propilparahidroksibenzoat, za koje je poznato da uzrokuju alergijske reakcije ranog i kasnog tipa.
- Lek sadrži aspartam, koji je izvor fenilalanina i može biti štetan za osobe sa fenilketonurijom.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Panaterm

Deci mlađoj od tri meseca, primenjivati samo po preporuci lekara, po 10 mg/kg. Kod dece mlađe od tri meseca ne davati lek duže od 2 dana bez konsultacije lekara.
Od 3 meseca do 1 godine: 2,5 -5 ml (1/2 do 1 mala kašika sirupa).
Od 1 do 5 godina: 5 – 10 ml (1 do 2 male kašike sirupa).
Od 6 do 12 godina: 10 – 20 ml (2 do 4 male kašike sirupa), 3-4 puta dnevno.
Kada je potrebno, ove doze mogu se ponavljati svakih 4-6 sati (maksmalno 4 doze u toku 24 sata).

Ako ste uzeli više leka Panaterm nego što je trebalo

Ukoliko je Vaše dete uzelo veću dozu leka nego što je preporučeno, odmah se obratite lekaru, čak iako se vaše dete dobro oseća. U slučaju predoziranja odmah se obratite lekaru, čak iako se dobro osećate, jer postoji rizik od ireverzibilnog oštećenja jetre.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Panaterm

Ukoliko ste zaboravili da uzmete vašu dozu, uzmite je što je pre moguće. Ukoliko je vreme za uzimanje naredne doze već blizu, možete je uzeti uobičajeno. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Ako ste zaboravili da uzmete lek nastavite sa sledećom dozom onda kada je preporučeno.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
Ako naglo prestanete da uzimate lek Panaterm
Nema podataka vezanih za nagli prekid terapije paracetamolom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Panaterm, kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu.

Neželjena dejstva koja se javljaju povremeno (učestalost je manja od 1 na 100 pacijenata):

- Oštećenje bubrega i jetre.

Neželjena dejstva koja se javljaju retko (učestalost je manja od 1 na 1000 pacijenata):

- Reakcije preosetljivosti (otok lica, koprivnjača, grč disajne muskulature-otežano disanje),
- Sniženje krvnog pritiska,
- Poremećaj svesti.

Neželjena dejstva koja se javljaju veoma retko (učestalost je manja od 1 na 10000 pacijenata):

- Trombocitopenija (smanjenje broja krvnih pločica u krvi koje imaju značajnu ulogu u zgrušavanju krvi),
- Agranulocitoza (smanjenje broja belih krvnih zrnaca što može dovesti do pojave infekcija).

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK Panaterm

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

3 godine.

Ne koristiti preparat nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Nakon otvaranja boce sirup se može koristiti mesec dana.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi ispod 25°C u originalnom pakovanju zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati!

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

7. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Panaterm

- 5 ml sirupa sadrži aktivnu supstancu paracetamol 120 mg
- Ostale pomoćne materije u leku su: sorbitol; natrijum-citrat, dihidrat; limunska kiselina, monohidrat; propilenglikol; makrogol 400; povidon K 25; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; aspartam; natrijum-hidrogensulfit (39% m/m); aroma (exotic flavour); prečišćena voda.

Kako izgleda lek Panaterm i sadržaj pakovanja
Panaterm je bistra viskozna tečnost, sa aromom voća i slatkog ukusa.
125 ml sirupa se nalazi u tamnoj staklenoj ili bočici od polietilentereftalata, sa zatvaračem od polietilena, koja je zajedno sa posudom za doziranje i uputstvom za pacijenta smeštena u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole:
Ivančić i sinovi d.o.o.
Adresa: Palmotićeva 13, Beograd, Srbija
Proizvođač:
Sopharma PLC
Adresa: 16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, Bugarska

Ovo uputsvo je poslednji put odobreno
Decembar 2008.

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole:
237/2009/12 od 28.01.2009. Panaterm , 120 mg / 5 ml, sirup, 125 ml, staklena bočica
4650/2009/12 od 03.09.2009. Panaterm , 120 mg / 5 ml, sirup, 125 ml, plastična bočica