Rehidran®

- prašak za oralni rastvor za nadoknadu tečnosti i elektrolita
- aroma jagode
- dijetetski proizvod

11,3 g praška za oralni rastvor

SASTAV	1 kesica	100 g
natrijum-hlorida glukoza monohidrata kalijum-hlorida trinatrijum-citrat dihidrata arome jagoda	1,30 g 7,40 g 0,75 g 1,45 g 0,40 g	11,50 g 65,49 g 6,64 g 12,83 g 3,54 g
nutritivne vrednosti	1 kesica	100 g
energetska vrednost	136,16 kJ (32,9 kcal)	1205 kJ (291 kcal)
ugljeni hidrati	7,96 g	70,49 g
proteini	0,01 g	0,09 g
masti	0,016 g	0,14 g
natrijum (Na)	0,76 g	6,749 g

Sastav pripremljenog rastvora	1 litar
natrijuma (Na^+) kalijuma (K^+) hlorida (Cl^-) citrata ($C_6H_5O_7^{3-}$) glukoze	74 mmol 20 mmol 64 mmol 10 mmol 75 mmol
Osmolalnost	243 mOsm
Energetska vrednost	272, 32 kJ (65,8 kcal)

➢ Šta je Rehidran®?

Rehidran® je mešavina glukoze i elektrolita namenjena za pripremanje rastvora kojim se organizmu nadoknađuju minerali i voda izgubljeni prolivom, povraćanjem ili opekotinama. Rastvor se priprema rastvaranjem sadržaja kesice u 500 ml prokuvane i do sobne temperature ohlađene vode. Pripremljeni rastvor se može koristiti 24 časa.

- **Kada se Rehidran® upotrebljava?**

Rehidran® se primenjuje kod lake ili srednje teške dehidriranosti organizma, kada je oralnim putem moguće ponovo uspostaviti i održavati normalnu hidraciju.
Osobama sa povišenim krvnim pritiskom, srčanim oboljenjima, edemima, dijabetes melitusom se savetuje da uzimaju Rehidran® isključivo pod lekarskim nadzorom.
Rehidran® ne treba uzimati kod postojećeg oštećenja bubrega, hiperkalemije, alkaloze i preosetljivosti na bilo koji sastojak preparata.

- **Kako se Rehidran® upotrebljava?**

Odrasli i deca: 1 kafena kašika ili 1 gutljaj rastvora u intervalima od nekoliko minuta, do uspostavljanja normalne hidracije, zatim prema potrebi. Uobičajeno se tokom perioda od 24 časa unese 1 – 3 l rastvora.

Ukoliko se u toku 24 sata ne uspostavi adekvatna rehidracija, potrebno je potražiti savet lekara ili farmaceuta.

U slučaju nemogućnosti gutanja, lekar može primeniti rastvor i putem sonde.

Čuvati na sobnoj temperaturi, na suvom mestu, van domašaja dece.
Ne koristiti proizvod po isteku datuma označenog na pakovanju.

/EAN kod: 8600101515070/
(i-znak tel: 0800 33 55 33; www.ivancic.rs)

Proizvodi Ivančić i sinovi d.o.o., Palmotićeva 13, Beograd, Srbija

Serija i rok upotrebe odštampani su na rubu kesice.

Logo / IVANČIĆ I SINOVI
zdravlje – to je trajanje/