(tekst uputstva)
DP-LF-0030

S. boulardii
Bulacol® 500

Efikasno rešenje za stomačne probleme

- **S. boulardii Bulacol 500**

S. boulardii Bulacol 500 je dodatak ishrani na bazi probiotskog kvasca po imenu *Saccharomyces boulardii* (*S. boulardii*) u obliku kapsula. U crevima čoveka, S. boulardii Bulacol 500 svojom aktivnošću doprinosi očuvanju zdravlja i funkcije digestivnog trakta odnosno ublažava intenzitet i trajanje stomačnih tegoba kao što su dijareja, nadutost, mučnina, bol u stomaku.

- **Šta je *Saccharomyces boulardii* i kako deluje?**

S. boulardii je probiotski kvasac koji deluje u lumenu creva. On ima sposobnost vezivanja patogenih bakterija (*Escherichia coli, Clostridium difficile*) i njihovih toksina za svoju površinu i pospešuje njihovo izbacivanje iz organizma. Na taj način *S. boulardii* sprečava vezivanje patogena za zid creva i ispoljavanje toksičnih efekata, koji su najčešće praćeni bolom u stomaku, mučninom i dijarejama.

- **Kome je S. boulardii Bulacol 500 namenjen i kada se upotrebljava?**

S. boulardii Bulacol 500 se efikasno može primenjivati:
- kod akutne dijareje kod odraslih osoba;
- kod dijareje izazvane uzimanjem antibiotika;
- kod putničke dijareje;
- kao dodatak terapiji crevnih oboljenja izazvanih bakterijom *Clostridium difficile*;
- kao dodatak terapiji koja se koristi za lečenje bakterije *Helicobacter pylori*.

S. boulardii Bulacol 500 ne treba da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak preparata. Preparat ne treba da koriste osobe slabog zdravlja i pacijenti sa centralnim venskim kateterom.

- **Kako se S. boulardii Bulacol 500 upotrebljava?**

Kapsulu progutati sa malo tečnosti. U slučaju da se preparat primenjuje kod osoba koje ne mogu da progutaju kapsulu, kapsula se može otvoriti i njen sadržaj razmutiti u maloj količini tečnosti i odmah popiti. Uzimanje preparata nije vezano za obrok.

U zavisnosti od problema preporučuju se sledeće doze:
- Kod akutne dijareje uzima se 1 – 2 kapsule dnevno.

- Kod dijareje koja je posledica primene antibiotika uzima se 1 – 2 kapsule dnevno.
- Kod dijareje koja je posledica infekcije bakterijom *Clostridium difficile* uzima se 2 kapsule dnevno u toku 4 nedelje, zajedno sa antibiotskom terapijom infekcije.
- U slučaju Kronove bolesti uzima se 1 kapsula dva puta dnevno u trajanju do 9 nedelja.
- Kod ulcerativnog kolitisa uzima se 1 kapsula dva puta dnevno.
- Kao dodatak terapiji za lečenje bakterije *Helicobacter pylori*, uzima se 1 kapsula dnevno zajedno sa propisanom terapijom.

Dodatne informacije:
- Ukoliko istovremeno sa preparatom S. boulardii Bulacol 500 uzimate oralno neki antimikotik (lek za lečenje gljivičnih infekcija), može doći do smanjenja efikasnosti preparata.
- Istovremeno konzumiranje alkohola sa preparatom S. boulardii Bulacol 500 umanjiće efikasnost preparata, jer alkohol ubija mikroorganizme koje ovaj preparat sadrži.

Kapsule preparata S. boulardii Bulacol 500 su biljnog porekla, pa ih mogu koristiti vegani i vegetarijanci.

- **Kako se čuva S. boulardii Bulacol 500?**

Čuvati na sobnoj temperaturi, zaštićeno od vlage.
Čuvati van domašaja dece.
Proizvod ne treba koristiti po isteku datuma označenog na pakovanju.

- **Pakovanje**

Kutija sa 10 kapsula.

Proizvođač: **Ivančić i sinovi d.o.o.**, Braće Trninić 31, Stari Banovci, Srbija
Distributer: **Ivančić i sinovi d.o.o.**, Palmotićeva 13, Beograd, Srbija

/Logo Ivančić i sinovi Zdravlje – to je trajanje/