UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Tribestan ® film tablete
Pakovanje: blister, 6x10 film tableta

Proizvođač: **SOPHARMA PLC**

Adresa: **16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, R. Bugarska**

Podnosilac zahteva: **Ivančić i sinovi d.o.o.**

Adresa: **Palmotićeva 13, 11 000 Beograd, Srbija**

Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik
Tribestan, film tableta
INN *Tribulus terrestris herba, suvi ekstrakt biljke* (35-45:1)

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za V*as.*
Ovaj lek možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek **Tribestan**, da bi ste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lek **Tribestan** i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek **Tribestan**
3. Kako se upotrebljava lek **Tribestan**
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek **Tribestan**
6. Dodatne informacije

1 ŠTA JE LEK Tribestan I ČEMU JE NAMENJEN

Tribestan je tradicionalni lek koji sadrži suvi ekstrakt nadzemnih delova biljke *Tribulus terrestris herba.* Tribestan stimuliše funkcije genitalnog sistema, povećava libido kao i snagu i trajanje erekcije.

Tribestan se tradicionalno primenjuje kod muškaraca u terapiji smanjenog libida (seksualne želje) i impotencije (seksualne nemoći).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Tribestan

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek* Tribestan *ne smete koristiti
- ako ste preosetljivi (alergični) na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih materija leka
- ako imate ozbiljna kardivaskularna oboljenja ili oboljenja bubrega; adenom prostate (benigna hiperplazija prostate – dobroćudno uvećanje prostate)
- ako ste mlađi od 18 godina.

Primena drugih lekova
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate diuretike ili lekove za hipertenziju (lekove u terapiji povišenog krvnog pritiska).
Kažite Vašem lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Tribestan sa hranom ili pićima
Nema specijalnih napomena u vezi primene leka sa određenom vrstom hrane ili pića. Lek je najbolje uzimati nakon obroka.

Primena leka Tribestan u periodu trudnoće i dojenja

Tribestan ne treba da koriste osobe ženskog pola.

Uticaj leka Tribestan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Tribestan ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Tribestan

Nema specijalnih napomena vezanih za pojedine sastojke leka **Tribestan.**

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tribestan

Uvek uzimajte **Tribestan** onako kako je preporučeno u uputstvu. Posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom ako imate neke nedoumice u vezi sa ovim lekom. Pre prve upotrebe leka potrebno je konsultovati se sa lekarom.

Uzimajte tablete oralno, najbolje nakon obroka.
Kod muškaraca sa smanjenim libidom i impotencijom, preporučena je doza od 1-2 tablete 3 puta dnevno.
Trajanje terapije – najviše 90 dana.
U slučaju razmatranja ponavljanja primene, neophodno je da se sprovede analiza enzima jetre.

Ako ste uzeli više leka Tribestan nego što je trebalo

Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja **Tribestanom** do danas. Međutim, ukoliko ste uzeli više leka nego što je preporučeno, konsultujte se sa Vašim lekarom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Tribestan

Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite onu koju ste propustili! Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Tribestan

Nema podataka vezanih za nagli prekid terapije lekom **Tribestan.**

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lekovi i **Tribestan** može prouzrokovati neželjena dejstva, ali se ne ispoljavaju kod svakog.
Reakcije preosetljivosti se mogu javiti kod nekih pacijenata. Moguća je pojava iritacije membrane stomačne mukoze.
Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna, ili primetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK Tribestan

Rok upotrebe

2 godine.

Ne uzimati **Tribestan** nakon isticanja roka upotrebe, koje je označeno na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe je poslednji dan naznačenog meseca.

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim zakonskim propisima

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Tribestan

- Jedna film tableta sadrži 250 mg suvog ekstrakta biljke Tribulus terrestris herba (35-45:1), koji sadrži furostanol saponina najmanje 112,5 mg.
Rastvarač: metanol 80% V/V.
- Ostale pomoćne materije u leku su:

celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, anhidrovani; povidon K 25; krospovidon; magnezijum-stearat; talk.
Sastav film omotača Opadry AMB Brown 80W26601: polivinil-alkohol; talk; titan-dioksid; gvožđe (III)- oksid, crveni; gvožđe (III)- oksid, crni; gvožđe (III)- oksid, žuti; lecitin soja; ksantan guma.

Kako izgleda lek Tribestan i sadržaj pakovanja

Tribestan su okrugle, bikonveksne, braon boje, film tablete sa specifičnim ukusom i dijametrom od 13 mm.
10 film tableta u PVC/Alu blisteru.
6 blistera u kartonskoj kutiji sa tekstom uputstva.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Ivančić i sinovi d.o.o.
Adresa: Palmotićeva 13, 11 000 Beograd, Srbija
Proizvođač: Sopharma PLC
Adresa: 16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, Bugarska

Ovo uputsvo je poslednji put odobreno

Avgust 2011.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole:

515-01-6283-09-001 od 01.11.2011.